



Suda hızlı çözünen ve bitki tarafından alımı kolay ve çabuk olan Agrobigen yaprak gübre serisi.

Nanoteknolojik Yaprak Gübreleri

AGROBİGEN - P

9-30-9+(2 MgO)+me



Garanti Edilen İçerik	%(W/W)
Toplam Azot (N)	% 9
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 3
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 5
Üre Azotu (CO(NH ₂) ₂)	% 1
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentoksit (P ₂ O ₅)	% 30
Suda çözünür Fosfor Pentoksit (P ₂ O ₅)	% 30
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda çözünür Bor (B)	% 0,1
Suda çözünür Demir (Fe)	% 0,4
Suda çözünür Manganez (Mn)	% 0,4
Suda çözünür Çinko (Zn)	% 0,4

Ecobigen Gübre Tarım Gıda Tic. San. Ltd. Şti.
Alparslan Mah. Samsun 1. Sok. No:13, Balta, Samsun / TÜRKİYE
Web: www.ecobigen.com.tr
E-posta: info@ecobigen.com.tr
Tel: +90 362 544 2102



ECOBİGEN
ÜRETİCİ FIRMA

1 kg



5 kg

Suda hızlı çözünen ve bitki tarafından alımı kolay ve çabuk olan NANO TEKNOLOJİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik**% (w/w)**

Toplam Azot (N)	% 9
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 3
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 5
Üre Azotu (CO(NH ₂) ₂)	% 1
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür	% 30
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 30
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda çözünür Bor (B)	% 0,1
Suda çözünür Demir (Fe)	% 0,4
Suda çözünür Mangan (Mn)	% 0,4
Suda çözünür Çinko (Zn)	% 0,4

AGROBİGEN - P**9-30-9+(2 MgO)+me**

Tavsiye Edilen Uygulama Dozu:
250-750 gr/100 lt su içerisinde tamamen çözülerek yaprakтан uygulanır. Kesin uygulama dozu, topraktan yapılan gübrelemeye göre seçilmelidir. Toprakтан P (Fosfor)'li gübreleme toprak analizine göre tam olarak yapıldı ise 250 gr/100 lt, P'li gübrelerden her hangi birisi için tam doz gübreleme yapılmadı ise 750 gr/100 lt, kısmi gübreleme yapıldı ise 500 gr/100 lt dozu önerilmektedir.

Bitki**Uygulama Zamanı**

Hububat (Arpa, Buğday, Çeltik vs)	Kardeşlenme döneminde uygulama yapılır.
Meyve ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali vs)	Pembe tomurcuk döneminden itibaren 15-20 gün arayla uygulanır.
Narenciye (Portakal, Mandarin, Limon vs)	Pembe tomurcuk döneminden itibaren 15-20 gün arayla 2 defa uygulanır.
Fındık	Çiçeklenme öncesi dönemde uygulanır.
Pamuk	Fide döneminde ve çapadan sonra uygulanır.
Mısır, Ayçiçeği	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 15 gün arayla 2 defa uygulanır
Çilek	Fide dikiminden itibaren 15-20 gün arayla uygulanır.
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	Çapadan sonra bitkiyi tam örtecek şekilde bir defa uygulanır.
Sebzeler	Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün arayla 2 defa uygulanır.
Diğer bitkiler	Bitkilerin erken gelişme döneminden 15-20 gün arayla uygulanır.