



Suda hızlı çözünen ve bitki tarafından alımı kolay ve çabuk olan Agrobigen yaprak gübre serisi.

# Nanoteknolojik Yaprak Gübreleri

## AGROBİGEN - D

17-17-17+me



Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Toplam Azot (N)	% 17
Nitrat Azotu (NO <sub>3</sub> -N)	% 7
Amonyum Azotu (NH <sub>4</sub> -N)	% 3
Üre Azotu (CO(NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> )	% 7
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür	
Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	% 17
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	% 17
Suda çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	% 17
Suda çözünür Bor (B)	% 0,1
Suda çözünür Demir (Fe)	% 0,2
Suda çözünür Mangan (Mn)	% 0,2
Suda çözünür Çinko (Zn)	% 0,2

## AGROBİGEN - D

17-17-17+me

**Tavsiye Edilen Uygulama Dozu:**  
250-750 gr/100 lt su içerisinde tamamen çözülerek yapraklardan uygulanır. Kesin uygulama dozu, topraktan yapılan gübrelemeye göre seçilmelidir. Toprakta N (Azot), P (Fosfor), K (Potasyum)'lı gübreleme toprak analizine göre tam olarak yapıldı ise 250 gr/100 lt, NPK'lı gübrelerden herhangi birisi için tam doz gübreleme yapılmadı ise 750 gr/100 lt, kısmi gübreleme yapıldı ise 500 gr/100 lt dozu önerilmektedir.

Bitki	Uygulama Zamanı
Hububat (Arpa, Buğday, Çeltik vs)	Kardeşlenme, sapa kalkma ve dane oluşum dönemlerinde uygulama yapılır.
Meyve ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali vs)	Fare kulağı döneminde ve hasat sonrası 15-20 gün arayla birkaç sefer uygulanır.
Narenciye (Portakal, Mandarin, Limon vs)	Çiçeklenme döneminden başlayarak hasat sonuna değin 15 gün arayla uygulamalar tekrarlanır.
Fındık	Döllenme ve çotanak bağlama döneminden hasata değin birkaç seferde uygulama yapılır.
Pamuk	Seyretme işleminden sonra 15 gün arayla birkaç sefer uygulama yapılır.
Mısır, Ayçiçeği	Yaprak gelişimi dönemi boyunca bitki 50 cm boyunda iken uygulanır.
Çilek	Çıkıştan ve/veya şaşırtmadan 15 sonra ilk uygulama yapılır ve 15 gün sonra uygulama tekrarlanır.
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	Bitkilerin gübre alımına izin verecek yaprak büyüklüğüne erişmesinden itibaren gelişme dönemi boyunca 15 günde bir uygulanır.
Sebzeler	Fide dikiminden itibaren gelişme dönemi boyunca 15-20 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.
Diğer bitkiler	Bitkilerin gübre alımına izin verecek yaprak büyüklüğüne erişmesinden itibaren gelişme dönemi boyunca 15-20 gün arayla birkaç sefer uygulanır.